



Classificação clínica de BAMFORD para o AVC agudo.

- Sind. lacunares (**LACS**)
- Sind. da circulação anterior total (**TACS**)
- Sind. da circulação anterior parcial (**PACS**)
- Sind. da circulação posterior (**POCS**)

LACS:

- Sind. Motora pura
- Sind. Sensitiva pura
- Disartria - "Clumsy Hand"
- Hemiparesia atáxica
- * s/ afasia, distúrbio visuoespacial, distúrbio de campo visual ou de tronco
- * déficits proporcionados

TACS:

- Hemiplegia
- Hemianopsia
- Disfunção cortical superior (linguagem, função visuoespacial, nível de consciência)
- * 25% hematoma intraparenquimatoso

PACS:

- Déficit S/M + hemianopsia
- Déficit S/M + disfunção cortical
- Disfunção cortical + hemianopsia
- Disfunção cortical + motor puro (monoparesia)
- Disfunção cortical isolada

POCS:

- Paralisia par craniano (única ou múltipla) ipsilateral + déficit S/M contralateral
- Déficit S/M bilateral
- Alt. movimentos conjugados dos olhos
- Disfunção cerebelar s/ déficit de trato longo ipsilateral
- Hemianopsia isolada ou cegueira cortical.

Deve ser aplicada na primeira avaliação à beira do leito.

Bamford J, Sandercock P, Dennis M, Burn J, Warlow C. "Classification and natural history of clinically identifiable subtypes of cerebral infarction." Lancet 22;337(8756):1521-6, 1991.

"How well does the Oxfordshire Community Stroke Project classification predict the site and size of the infarct on brain imaging?" J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;68:558-562.